



## DIFTEROVIRUELA INMUNER<sup>®</sup>

Vacuna a virus vivo para la inmunización activa y prevención de las enfermedades de las aves de corral prevenibles por acción de cepa de virus Gallina del la Enfermedad de la Difteroviruela. Cultivada en embrión de pollo SPF

### **Indicaciones**

La vacuna se aplica en ponedoras comerciales, reproductores y parrilleros de cualquier edad.

### **Características**

El tiempo necesario para conferir inmunidad es de 5 a 7 días. En las aves vacunadas a temprana edad la inmunidad dura entre 90 a 120 días lo que resulta suficiente para pollos parrilleros. En aves de postura es necesaria una revacunación para conferir inmunidad durante todo el ciclo productivo.

### **Programa de vacunación**


Para elaborar un plan de vacunación ajustado a las necesidades de cada zona se recomienda consultar a un Veterinario especialista en avicultura o al Departamento Técnico de Laboratorios INMUNER.

### **Vías de aplicación y modo de empleo**

La vacuna se administra por punción en la membrana del ala, perforándola con la lanceta que posee una doble aguja con ranuras longitudinales.

### **Preparación para su correcto uso**

Se retiran los precintos y se introduce la boca del frasco de vacuna dentro del frasco de diluyente, agrega el diluyente al frasco que contiene la pastilla de la vacuna liofilizada y luego pasa el total del contenido al segundo. Se retira el frasco de vacuna, entonces se coloca el tapón de goma a la solución de vacuna en el frasco de diluyente y se agita hasta la total disolución de la vacuna quedando listo para introducir la lanceta.



### **Dosificación**

La dosis a utilizar es de 0.01 ml por ave, contenido en la lanceta.

La dosis podrá repetirse a los 14 días de la primera vacunación.

### **Control post vacunación**

Se puede realizar control de púpula palpando el punto de punción ( membrana del ala ) siete días postvacunación. Debiéndose detectar reacción positiva.

### **Validez**

El vencimiento desde la fecha de elaboración es de 24 meses.

### **Conservación:**

Conservar la vacuna al abrigo de la luz y a temperatura entre 2° C y 8° C.

### **Precauciones**

En la aplicación se debe evitar tocar los músculos, huesos, vasos sanguíneos y plumas; porque se puede generar una reacción inflamatoria más intensa.

Se debe evitar vacunar aves debilitadas, enfermas o con cuadros severos de inmunosupresión.

Bajo las condiciones de uso recomendadas la vacuna no presenta efectos colaterales, incompatibilidades ni antagonismos.

El producto debe ser utilizado en su totalidad después de ser reconstituido.

Los envases deben ser incinerados luego de ser utilizados. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.



### **LABORATORIOS INMUNER S.A.I.C.**

9 de julio 1451 - (3260) - Entre Ríos - Argentina.

Teléfono + 54 3442 425948 -

Inmuner@inmuner.com - www.inmuner.com

Responsable Técnico: Dr. Raúl F. Novella  
Médico Veterinario - R.P. 0-287.

Habilitación oficial SENASA:

Planta de elaboradora de vacunas, Reg. N° 7.465

Planta elaboradora de Huevos S.P.F., Reg. N° 7.464

