



Presentación

Frascos de 250 y 500 ml de capacidad, de polipropileno. Sellados con tapón de goma perforable y precinto de aluminio color blanco.

Etiquetados con instrucciones de uso.

NBS TRI ÓLEO 100 INMUNER®

Vacuna inactivada combinada y adsorbida en emulsión oleosa, agua en aceite, para la prevención de las enfermedades de Newcastle, Bronquitis y Síndrome Caída de puesta de las aves. Elaborada a partir de cultivos puros de cepa Newcastle La Sota y Bronquitis Mass en embriones de pollo SPF (Libre de Patógenos Específicos) y la cepa Adeno 127 de la enfermedad de Síndrome Caída de Puesta.

Indicaciones

NBS Tri Óleo 100 está indicada para prevenir las enfermedades de Newcastle, Bronquitis y Síndrome de Caída de Puesta en aves de reposición (ponedoras comerciales y reproductores), previa aplicación de vacunas vivas según plan de vacunación.

Recomendaciones

En aves reproductoras padres y abuelos-, antes de entrar a producción, entre las 14 y 18 semanas de edad, según la línea.

Características

Cultivos puros de virus de Newcastle cepa La Sota, -de Bronquitis cepa Massachusetts- y virus de Adeno celo cepa Adeno 127, -elaborados en embrión de pollo S.P.F. Libres de Patógenos y Anticuerpos Específicos-. Combinados y absorbidos en emulsión oleosa, agua en aceite (estos cultivos virales de altos títulos son concentrados y purificados por procesos de centrifugación y ultrafiltración tangencial).

Las vacunas oleosas INMUNER® son presentadas en una emulsión que combina la fase acuosa, vehículo del antígeno, dentro de la fase oleosa. Esta última es formulada con aceites minerales de máximo grado de pureza y calidad, especialmente aprobados, por su total inocuidad, para su uso inyectable.


- Las vacunas oleosas INMUNER® son formuladas con adyuvantes que facilitan su administración, por la fluidez de las mismas.
- La óptima combinación cuali - cuantitativa de emulgentes garantizan la uniformidad y estabilidad de la emulsión durante la vida útil de la vacuna, como así también su integridad antigénica.
- Las vacunas oleosas INMUNER® una vez inyectadas, son degradadas por los sistemas enzimáticos del ave, induciendo una respuesta inmunitaria inmediata, uniforme y prolongada, confiriendo altos títulos de anticuerpos protectivos.

PERFIL DE ANTICUERPOS DESARROLLADOS EN AVES VACUNADAS CON NBS TRIOLEO 100 INMUNER


Lote de aves S.P.F. de 16 semanas vacunados con vacuna NBS Tri Oleo 100 INMUNER .

Dosificación: 1 dosis (0,5 ml).


Edad de vacunación: 16 semanas.



DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS HI CONTRA ENFERMEDADES DE BRONQUITIS INFECCIOSA



PERFIL DE ANTICUERPOS CONTRA ENFERMEDAD DE SÍNDROME DE CAÍDA DE PUESTA



Modo de empleo

El producto viene formulado para su uso en forma directa. Sacar las vacunas de refrigeración 12 horas antes de su uso para facilitar su administración, exponiendo las mismas a temperatura ambiente. Agitar durante unos segundos previos a su uso. Utilizar agujas inoxidables N° 9, cambiar la misma cada 500 aves.

Controle la correcta vacunación, las aves mal vacunadas suelen sacudir la cabeza, rascarse, sangrar o tienen las plumas del área mojadas. Estas aves deben ser revacunadas.

Vía de Administración y forma de aplicación

Inyección intramuscular en pechuga o muslo ó subcutánea en el tercio inferior de la región dorsal del cuello.

Dosificación

Se recomienda aplicar a la dosis de 0,5 ml/ave.

Establecimiento Elaborador



**LABORATORIOS
INMUNER S.A.I.C.**

9 de julio 1451 - (3260) - Entre Ríos - Argentina.
Teléfono + 54 3442 425948 -
E-mail inmuner@inmuner.com - www.inmuner.com

Conservación

Mantener entre 2° y 7°. No congelar. No exponer a la luz solar.

Validez

El período de vencimiento es de 18 meses a partir de la fecha de elaboración.

Precauciones

Observe la emulsión sin agitar. Es aceptable que luego de un prolongado período de reposo se forme un sobrenadante en la superficie de la emulsión que desaparecerá al agitar el frasco. En caso de ruptura de emulsión, el sobrenadante se observará en el fondo del frasco la porción acuosa que contiene el antígeno. En tales condiciones la vacuna no debe utilizarse, aunque se homogenice después de ser agitada (Ver figura).



Importante

Al aplicar la vacuna la población debe encontrarse en plenitud fisiológica para lograr buena inmunidad, evitar estados de estrés o inmunosupresión.

Anotar número de serie y fecha de vencimiento de la vacuna.

Mantener fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.

Leer atentamente las instrucciones de uso en prospecto adherido al frasco de vacuna.

Se recomienda realizar monitoreos serológicos posvacunación para determinar la seroconversión antes de que las aves ingresen en la etapa de producción. Laboratorios INMUNER cuenta con este servicio posventa.

Responsable Técnico: Dr. Raúl F. Novella
Médico Veterinario - R.P. 0-287.

Habilitación oficial SENASA:
Planta de elaboradora de vacunas, Reg. N° 7.465
Planta elaboradora de Huevos S.P.F., Reg. N° 7.464