



PREVENCOC INMUNER

Instructivo de vacunación

Uso veterinario

Indicada en aves de reposición para la prevención de la Coccidiosis

Presentación:

Viales de vacuna x 10 ml correspondiente a 1000 dosis, dispuestos en soporte de 10 unidades. Frasco de diluyente (x 500 ml) cada 1000 dosis de vacuna. Acompaña a presentación indicador de vacunación masiva.

Administración vía Agua- gel:

- ✓ **Edad de vacunación:** 3-5 días.
- ✓ Corte el agua de bebida de las aves de 2 horas previas a realizarse la vacunación.
- ✓ Limpie los bebederos sin usar desinfectantes ni agua clorada.
- ✓ No añada al agua de bebida otras sustancias durante la vacunación.
- ✓ No administre agua de bebida por otra vía hasta no haber sido consumida la vacuna en su totalidad.

Preparación de la vacuna y administración:

- Tome un vial de vacuna. Homogenice por agitación la suspensión. Extraiga el contenido total de vacuna, con jeringa, y transfíralo al frasco de diluyente Gel.
Inocule 6 ml de indicador en el frasco de diluyente. Agite el frasco hasta homogenización del color, enérgicamente.
- Diluya la vacuna reconstituida en 10 litros de agua de bebida (a razón de 1000 ds/ 10 lt), en un recipiente adecuado. Homogenizar la solución para lograr una buena dispersión del gel y la distribución uniforme de los oocistos.
- Una vez diluida fraccione, en bebederos "honguito", 1 litro para cada uno de estos bebederos, que es cantidad suficiente para vacunar 100 aves.
- Homogenice la vacuna periódicamente y suavemente en los bebederos.
- Un ayudante deberá hacer rotar las aves durante la vacunación.
- Se recomienda que se coloque papel debajo de los bebederos.

Nota: En caso de que se utilicen habitualmente otro sistema de bebederos, sustitúyalo por el indicado para la administración de la vacuna o consulte nuestro asesoramiento técnico.

Precauciones:

- ✓ Administre la vacuna inmediatamente a su reconstitución.
- ✓ Vacune sólo poblaciones sanas.
- ✓ No utilice para la administración de la vacuna el tanque general del agua.
- ✓ No administre drogas anticoccidiales en el alimento ni en el agua de bebida, durante la vida del ave.
- ✓ No utilice drogas antibacterianas con efecto anticoccidial durante las 4 semanas posteriores a la vacunación (Ej: Sulfas y/o Tetraciclinas).

Por cualquier consulta sírvase dirigirse a nuestro Dpto. Técnico.